



ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO “LOS ALMENDROS”

**PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD, FIEBRE Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIONES:**

Enfermedad:

- La educadora Informará a la Directora del Centro.
- Localizar a los padres o tutores legales, llamando a los teléfonos que registraron en el momento de la matriculación y dejando un mensaje de voz en caso de no localizarles.
- Comunicar que deben venir a recoger a su hijo/a y llevarlo al médico lo más pronto posible. Un niño/a enfermo no debería permanecer en el centro.
- Si la familia no está localizable y la situación lo requiere se trasladará al niño/a a un centro médico.
- En caso de enfermedades seguiremos el protocolo de aislamiento marcado en la siguiente tabla :

ENFERMEDAD	PERIODO DE CONTAGIO	PERIODO DE AISLAMIENTO
<b>Fiebre de cualquier origen + 38º C</b>		Hasta pasadas 24 horas como mínimo desde el último ascenso febril.
<b>Diarreas o vómitos</b>	Hasta que hayan pasado 24h. como mínimo desde la última deposición normal.	Hasta que hayan pasado 24 horas como mínimo de los últimos vómitos y las deposiciones sean normales. Si es de origen no infeccioso se estudiará cada caso en particular previo informe médico.
<b>Conjuntivitis purulenta</b>		24 horas después de iniciado el tratamiento.
<b>Pediculosis (Piojos)</b>	Mientras permanecen vivos los parásitos o huevos.	Hasta que haya llevado el tratamiento específico y el pelo esté libre de piojos y liendres.
<b>Lesiones bucales ( aftas, herpes,...)</b>		Según la gravedad de la lesión y el estado general del niño.
<b>Gripe,otitis,faringitis,...</b>		Hasta pasadas 24 horas desde el último ascenso febril y según el estado general del niño.
<b>Impétigo (infección cutánea)</b>		Hasta que las lesiones en la piel estén totalmente curadas.



<b>Escarlatina</b>	De 2 a 5 días .	48 horas después de la primera toma de antibiótico
<b>Varicela</b>	Mientras haya vesículas.	Hasta que todas las lesiones estén en fase de costra.( Unos 7 días)
<b>Rubeola</b>	Hasta cinco o seis días desde el inicio de la erupción.	Seis días desde el inicio de la erupción.
<b>Tosferina</b>	Hasta 21 días si no se inicia tratamiento con antibiótico.	Hasta 5 días después de iniciado el tratamiento.
<b>Virus boca-mano-pie</b>	De 3 a 6 días antes de que aparezcan síntomas.	Por la edad de los niños y la forma de contagio, se propaga muy rápido en estas edades. Se aconseja la exclusión del centro según el estado general del niño. También si babea mucho o si las ampollas que le han salido no las tiene secas.

Fiebre:

Cuando un alumno/a presente fiebre, los pasos a seguir serían:

- La educadora Informará a la Directora del Centro.
- Localizar a los padres o tutores legales, llamando a los teléfonos que registraron en el momento de la matriculación y dejando un mensaje de voz en caso de no localizarles.
- Comunicar que deben venir a recoger inmediatamente a su hijo/a.
- Exclusivamente, si no se localiza a familiar alguno, la educadora le tomará la temperatura cada 30 minutos y si ésta alcanzase los 38.5 ° (temperatura axilar) y los padres no se han puesto en contacto con el centro, la educadora podrá suministrar un antitérmico siempre que el centro tenga la autorización firmada por los padres o tutores expresa para estos casos.
- En caso de no remitir la fiebre la directora del centro llevará al niño/a al centro de salud más cercano, llevando consigo fotocopia de la cartilla de la seguridad social, tarjeta sanitaria y/o el informe médico solicitado en la matriculación.
- Si hiciera falta el traslado en ambulancia a un centro hospitalario la Directora del Centro acompañará al niño/a hasta la llegada de sus familiares. En caso de ausencia de la Directora, será una educadora la que acompañe al niño/a.

Administración de Medicamentos:

- Tener copia del informe médico y/o receta, donde se detalle cantidades, horarios de administración del fármaco, nombre y apellidos del niño.
- Los padres o tutores han de escribir en el envase del medicamento nombre y apellidos del niño, cantidades a suministrar y horarios de administración del fármaco. Tener en cuenta condiciones de conservación del medicamento (por ejemplo, temperatura)